

Indicaciones Scanner (TAC)

Tomografía computarizada *sin medio de contraste*

Indicaciones previas

- Traer Orden Médica.
- Traer exámenes anteriores.
- Asistir sin objetos metálicos, joyas ni objetos de valor
- Este examen está contraindicado en embarazadas.
- Scanner de Pielotac, requiere retener orina al momento de tomar el examen, se recomienda tomar abundante líquido al menos 1 hora antes.

Tomografía computarizada (TC/TAC) *con medio de contraste*

Indicaciones previas (*Adicional a lo anterior*)

- Debe tener 4 horas de ayuno
- Deben tomarse el examen de creatinina a los siguientes pacientes:
- Mayores de 60 años, con antecedentes de enfermedad renal, hipertensos, diabéticos, resistencia a la insulina, monorreno, lupus, insuficiencia cardíaca descompensada, mieloma múltiple, miastenia gravis.
- El examen de creatinina tiene una vigencia de 1 mes de antigüedad respecto a la fecha de toma del examen de imagenología.
- Pacientes que tomen metformina, deben traer examen de creatinina actualizada posterior a la última inyección de contraste.
- Pacientes que tomen metformina, deben suspenderla 2 días después del examen, previa consulta con su médico tratante, y 2 días posterior a el examen.
- Pacientes con alergia a medicamentos, alergia ambiental y/o alimentos se deben premedicar, y la puede solicitar directamente al servicio de imagenología un día antes.
- Pacientes con insuficiencia renal que se dializan, se debe coordinar el TAC con ésta. Se administra medio de contraste previa autorización por escrito del médico tratante.
- El examen con medio de contraste está contraindicado en pacientes menores de 1 año y en el embarazo. Además, esta contraindicado para pacientes con hipertiroidismo.

Lugar de Atención y Venta de Bonos:
Cardenio Avello 36, Primer piso Imagenología.

